



INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

GLIFOSATO 757 g/kg

Aditivos c.s.p. 1 kg

Nombre Químico

N-(phosphonomethyl) glycine como sal monoamónica de formulación a 20° C

No. CAS

1071-83-6

Grupo IRAC

Grupo químico: Organofosforados 1B

FORMULACIÓN

Gránulos solubles en agua (SG)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico:	Gránulos
Color:	Blanco a amarillo claro.
Olor:	Inodoro.
pH:	3-6
Densidad relativa:	0,5 g /cm ³ (20 °C)
Solubilidad en agua:	Libremente soluble
Corrosividad:	El glifosato es corrosivo para el acero sin revestimiento y acero galvanizado.
Punto de inflamabilidad:	>93°C
Explosividad	No explosivo

MODO DE ACCIÓN

Herbicida de acción sistémica no selectivo, que es absorbido por el follaje, con rápida translocación en toda la planta. Inactivo en contacto con el suelo.

MECANISMO DE ACCIÓN

ARRASADOR INTEROC CUSTER® actúa inhibiendo el 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintetasa, una enzima de la biosíntesis del ácido aromático. Este previene la síntesis de aminoácidos esenciales aromáticos necesario para la biosíntesis de proteínas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una aplicación cuando las malezas se encuentran en etapa de crecimiento y antes de floración. Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de **ARRASADOR INTEROC CUSTER®** y agite. Adicione el resto de agua.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C.	LMR	P.R.
Banano (<i>Musa acuminata</i>)	Paja mona (<i>Leptochloa filiformis</i>) Meloncillo (<i>Melothria pendula</i>) Paja churcada (<i>Panicum trichoides</i>) Botoncillo o Tabaquillo (<i>Borreria laevis</i>) Pata de Gallina (<i>Eleusine indica</i>) Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>)	1 aplicación cuando la maleza esté en pleno crecimiento 2.0 kg/ha	N.A.	0.1*** 0.05** mg /kg	*0 horas
Café (<i>Coffea arabica</i>)	Barbasco (<i>Polygonum nepalense</i>) Guasca (<i>Galinsoga parviflora</i>) Hierba de pollo (<i>Commelina diffusa</i>) Siempre viva (<i>Drymaria cordata</i>)		N.A.	0.1*** mg/kg	
Arroz (<i>Oryza sativa</i> L.)	Liendre puerco (<i>Echinochloa colonum</i>) Guardarrocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Paja mona (<i>Leptochloa filiformis</i>) Palo de agua (<i>Ludwigia decurrens</i>) Menta o ajillo (<i>Cyperus iria</i>) Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>) Arroz rojo (<i>Oryza sativa</i>)	1 aplicación en pre-siembra del cultivo (quema) 2.0 kg/ha	N.A.	0.1*** mg /kg	

DIRECCIÓN:

Vereda Siberia km 2.5,
Vía Bogotá – Siberia
Complejo Logística El
Pino Bodega No. 5

TELÉFONOS:

(+57601) 307 2390

WEB:

interoc@interoc.biz

Aguacate (<i>Persea americana</i>)	Brachiaria dulce (<i>Brachiaria decumbes</i>) Hierba socialista (<i>Emilia sonchifolia</i>) Siempre viva (<i>Commelina diffusa</i>) Yerba de sapo (<i>Euphorbia hirta</i>) Botoncillo (<i>Borreria laevis</i>) Batatilla (<i>Ipomoea spp</i>) Escoba negra (<i>Sida acuta</i>) Cortadera (<i>Cyperus ferax</i>) Pasto guinea (<i>Panicum maximum</i>) Helecho (<i>Pteridium aquilinum</i>)	1.5 kg/ha	N.A.	0.1*** mg/kg
Potreros	Escoba blanca (<i>Melochia parvifolia</i>) Brachiaria (<i>Brachiaria sp</i>) Dormidera (<i>Mimosa pudica</i>) Suelda con suelda (<i>Commelina diffusa</i>) Estrellita (<i>Dichoromena ciliata</i>) Pegapega (<i>Desmodium sp</i>) Cortadera (<i>Cyperus iria</i>) Pasto argentina (<i>Cynodon dactylon</i>)	2 kg/ha	N.A.	N.A.
Cítricos	Cadillo (<i>Bidens pilosa</i>) Siempre viva (<i>Commelina diffusa</i>) Pega pega (<i>Desmosium tortuosum</i>) Hierba socialista (<i>Emilia sonchifolia</i>) Pasto morado (<i>Leptochloa filiformis</i>) Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>) Pasto guinea (<i>Panicum maximum</i>) Caminadora verdadera (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)	1.5 kg/ha	N.A.	0.1*** mg/kg

*0 horas

EQUIPOS Y VOLUMENES DE MEZCLA:

Se pueden utilizar fumigadoras de espalda, con los equipos convencionales que posean una boquilla adecuada para herbicidas. El volumen de agua a utilizar es 200 L/ha. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas preliminares a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para demostrar que la mezcla sea físicamente compatible, eficaz y no fitotóxica bajo las condiciones locales de uso. Si se usa a las dosis recomendadas es poco probable que se presenten problemas de fitotoxicidad. **ARRASADOR INTEROC CUSTER®** puede disminuir su eficacia cuando es mezclado con otros herbicidas.

PRECAUCIONES:

EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA. EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS. NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS. PROTÉJASE, CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS. PROTÉJASE, EVITE CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA.

Este herbicida debe ser aplicado a favor del viento, con equipos de aspersión bien calibrados y en buen estado. Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación". Durante las aplicaciones terrestres "utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación" además de equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno o PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para aplicación de plaguicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión. "Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón". En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo. "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado". Una vez preparado el caldo de aspersión, úselo inmediatamente, no lo guarde. Evite el uso de aguas sucias o duras debido a que puede afectar la eficacia de los equipos de aplicación y la eficacia del producto.

ADVERTENCIAS

Se deben respetar las franjas de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distante de cuerpos o cursos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación o cualquier

*Según resolución 30058 del 14 de agosto del 2018, 4.2, Parágrafo primero.

De acuerdo a los LMR establecidos en el CODEX. *De acuerdo a los LMR establecidos en la comisión europea

P.C.: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

P.R.: Período de reentrada

DIRECCIÓN:

Vereda Siberia km 2.5,
Vía Bogotá – Siberia
Complejo Logística El
Pino Bodega No. 5

TELÉFONOS:

(+57601) 307 2390

WEB:

interoc@interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

otra área que requiera protección.
Tenga en cuenta las franjas de seguridad y la regulación dada por el ICA.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

AVISO AL AGRICULTOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4

4. LIGERAMENTE PELIGROSO. PELIGRO.

PRESENTACIONES AUTORIZADAS

Fundas de aluminio trilaminadas para las presentaciones de: 50 g, 60 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 500 g y 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg, 100 Kg de contenido neto.
Cajas de cartón craft reforzada, caja de cartón blanca reforzada, en presentaciones de 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg y 100 Kg de contenido neto.

REGISTRO NACIONAL

PL0002152023

FORMULADOR

INTEROC S.A

Km. 16.5 vía a Daule Guayaquil – Ecuador

ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO. LTD

Xinanjiang, China

NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.

21 JiangXia St. Ningbo 315000 China

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 10-6, Shidai Square, N° 8 Lengjing Street, Ningbo 315010, Zhejiang Ningbo, China.

SINOCHEM AGRO CO., LTD

Plaza 4F, No. 233 North Changqing Rd., Pudong New Area, Shanghai. China.

CHINA JIANGSU INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL GROUP, LTD.

Add No. 5 West Beijing Road, Nanjing, Jiangsu, China.

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

N°3001 Ivjian Road, Binhai Economic Development Area, Weifang. Shandong – China.

HANGZHOU GREEN FIELD CHEMICAL CO., LTD

Room 703, No. 5 Xixi Center, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, China.

ZHUOCHEN INDUSTRIES (SHANGHAI) CO., LTD

Room 907, Longyu International Plaza. No. 329 Hengfeng Road, Shanghai, China.

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR

INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA

Dirección de bodega: Vereda Siberia km 2,5 Vía Bogotá - Siberia complejo logístico El pino Bodega No. 5.

FECHA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

30 de diciembre de 2024

DIRECCIÓN:

Vereda Siberia km 2.5,
Vía Bogotá – Siberia
Complejo Logística El
Pino Bodega No. 5

TELÉFONOS:

(+57601) 307 2390

WEB:

interoc@Interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER