



INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

FURALAXYL-M

125 g/l

Nombre Químico

Furalaxyl-M: methyl N-(2-furoyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate

No. CAS

Furalaxyl-M: 57764-08-6

Grupo FRAC:

Furalaxyl-M (Fenilamida): Grupo 4

FORMULACIÓN

Concentrado Emulsionable (EC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico:	Líquido cristalino
Color:	Amarillo claro
Olor:	Característico
pH:	4.46
Densidad relativa:	0,946 g/ml (20 °C)
Inflamabilidad	>36 °C
Persistencia de espuma	10 ml luego de 10 s.

MODO DE ACCIÓN

FRILEX, Fungicida de contacto y sistémico con acción protectora y curativa. Es absorbido a través de las raíces, tallos y hojas rápidamente. Es trasladado acropetalmente (en sentido ascendente) a través de la xilema de las plantas.

MECANISMO DE ACCIÓN

FRILEX® Inhibe en el desarrollo de los hongos interfiriendo con la síntesis de proteínas, más específicamente inhibiendo el ácido ribonucleico. Actúa impidiendo el crecimiento subcuticular de las hifas del patógeno en los tejidos afectados de la planta por lo que su acción primordial se califica como curativa.

MODO DE EMPLEO:

Para preparar el caldo de aspersión, agite el envase antes de dosificar. Diluya la cantidad recomendada de **FRILEX** en un

recipiente aparte con un poco de agua, hasta obtener una mezcla homogénea. Agregar esta premezcla en la cantidad de agua a emplear de acuerdo a la superficie que pretende proteger. Agite constantemente y úselo de inmediato.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C.	LMR	P.R.
Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	Mildeo vellosa (<i>Peronospora sparsa</i>)	2 cm ³ /l o 3 l/ha	N/A	Furalaxyl: *0.01 mg/kg	4 horas
TOMATE (<i>Solanum lycopersicum</i>)	GOTA o TIZON TARDIO (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.0 a 1.5 cm ³ /l o 3 l/ha dependiendo de los niveles de infestación	**5 días	Furalaxyl: *0.01 mg/kg	
PIÑA (<i>Ananas comosus</i>)	Pudrición de cogollo (<i>Phytophthora parasitica</i>)	1.5 l/ha	**14 días	Furalaxyl: *0.01 mg/kg	

*Valor determinado por defecto al no existir LMR de referencia.

Periodo de carencia calculado con máximo de 3 aplicaciones de **FRILEX por ciclo de cultivo o producción.

P.C.: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

P.R.: Período de reentrada

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

FRILEX® se aplica cuando las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la enfermedad. Puede aplicarse cada 7 días con la aparición de los primeros síntomas. Se recomienda rotar con productos de diferente modo de acción.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

En rosa y tomate se puede utilizar con cualquier pulverizador de mochila, manual o motorizado, con boquillas rotor c-35, siempre que garanticen una buena distribución de la aspersión, una correcta y pareja homogenización del caldo de aspersión y suficiente caudal para un correcto mojado del follaje tratado. En tomate puede usarse el equipo comúnmente empleado por los agricultores de la zona. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

FRILEX, no se recomienda mezclar con otros productos por problemas de incompatibilidad que pueda presentarse. En caso de necesidad de estas mezclas se recomienda realizar primero pruebas sobre un pequeño número de plantas y evaluar tanto la efectividad como los problemas de manchado

DIRECCIÓN:

Carrera 7 # 156 –
78 Piso 11 Edf.
North Point

TELÉFONOS:

(601) 307 2390

WEB:

interoc@interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

o pérdida de calidad de la planta, antes de hacerlo a gran escala. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no se espera que se presenten problemas de fitotoxicidad.

ADVERTENCIAS:

Evitar aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas y realizar las aplicaciones en horas tempranas. Evite contaminar con **FRILEX®** las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **FRILEX®**, en la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Tenga en cuenta las franjas de seguridad y la regulación dada por el ICA

"Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 m, respectivamente con relación a los cuerpos de agua". Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

"Este producto puede ser mortal si se ingiere". No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE". "NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO". "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES".

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

AVISO AL AGRICULTOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4

4 LIGERAMENTE PELIGROSO. PELIGRO

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:

Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) para líquidos de 0.5, 1, 5 y 20 litros de contenido neto.

REGISTRO NACIONAL

PL0000772023

FORMULADOR

INTEROC S.A.

Km 16.5 Vía Daule

JIANGSU BAOLING CHEMICAL, LTD.

No. 9 Tongwang Road, Nantong, Jiangsu, China.

AGROFINA S.A.

Buenos Aires, Argentina.

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR

INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA

Vereda Siberia km 2,5 Vía Bogotá - Siberia complejo logístico El pino Bodega No. 5.

FECHA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

21 de enero de 2025

DIRECCIÓN:

Carrera 7 # 156 –
78 Piso 11 Edf.
North Point

TELÉFONOS:

(601) 307 2390

WEB:

interoc@interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER