



INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Pyrimethanil	600 g/l
Aditivos	c.s.p. 1 l

Nombre Químico

N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl-) aniline de formulación a 20°C.

No. CAS

53112-28-0.

FORMULACIÓN

Suspensión concentrada (SC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico:	Líquidos
Color:	Beige
Olor:	Característico
pH:	6.69 ± 0.01
Densidad:	1.0876 g/ml (20 °C)
Presión de vapor:	2.2 mPa (25°C)
Punto de inflamabilidad:	>100°C
Solubilidad en agua:	Suspender en agua.

MODO DE ACCIÓN

Fungicida de contacto con actividad translaminar, tiene acción protectante y curativa.

MECANISMO DE ACCIÓN

PRAGA® inhibe la secreción de enzimas hidrolíticas en el hongo, impidiendo que este degrade y digiera los tejidos de la planta, controlando así el proceso de infección en el desarrollo de la enfermedad.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C.	P.R.
Banano (Musa x paradisiaca)	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis morelet)	0.5 l/ha	0 días	4 horas
Fresa, Uva, Mora, Frambuesa, Arándano ojo de cranberry, Arándano ojo de conejo, Arándano alto.	Botrytis (Botrytis cinerea)	0.5 l/ha	21 días	

*USO ORNAMENTALES

CULTIVO	PLAGA BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C.	P.R.
**Ornamentales Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (Botrytis cinerea)	0.75 cm³/l	N.A.	4 horas

*Resolución No. 00001418 del 18 de febrero de 2016 que permite la ampliación de uso en ornamentales.

**Pruebas de fitotoxicidad en ROSA (Rosa sp.), CLAVEL (Dianthus caryophyllus)

*** Volumen de aplicación de 1000 L/ha.

"Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada."

P.C.: Período de carencia

P.R.: Período de reentrada

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar las aplicaciones cuando se detecte los primeros síntomas de la enfermedad. Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de **PRAGA®** y agite. Adicione el resto del agua.

MODO DE APLICACIÓN

Su forma de aplicación se puede realizar de forma aérea o terrestre.

EQUIPOS Y VOLUMENES DE MEZCLA:

El sistema de aplicación terrestre puede ser con una bomba de aspersión con motor, provista de una turbina inyectora de aire de gran alcance. El equipo deber ser calibrado previa la aplicación.

DIRECCIÓN:

Vereda Siberia km 2.5,
Vía Bogotá – Siberia
Complejo Logística El
Pino Bodega No. 5

TELÉFONOS:

(+57601) 307 2390

WEB:

interoc@interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas a gran escala. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no se espera que se presenten problemas de fitotoxicidad.

PRAGA® es incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.

PRECAUCIONES:

EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA. EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS. NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS. PROTÉJASE, CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS. PROTÉJASE, EVITE CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA.

Este fungicida debe ser aplicado a favor del viento, con equipos de aspersión bien calibrados y en buen estado. Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación". Durante las aplicaciones terrestres "utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación" además de equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno o PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para aplicación de plaguicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión. "Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón". En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo. "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado". Una vez preparado el caldo de aspersión, úselo inmediatamente, no lo guarde. Evite el uso de aguas sucias o duras debido a que puede afectar la eficacia de los equipos de aplicación y la eficacia del producto.

ADVERTENCIAS

Se deben respetar las franjas de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distante de cuerpos o cursos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación o cualquier otra área que requiera protección.

Tenga en cuenta las franjas de seguridad y la regulación dada por el ICA.

Este producto es altamente tóxico para aves.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

AVISO AL AGRICULTOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4

4. LIGERAMENTE PELIGROSO. PELIGRO.

PRESENTACIONES AUTORIZADAS

Envases de polietileno de alta densidad, tereftalato de polietileno (PET) COEX y polipropileno de alta densidad 30 cm³, 50 cm³, 100 cm³, 200 cm³, 250 cm³, 300 cm³, 500 cm³, 600 cm³, 1 L, 3.6 L, 5 L, 20 L y 200 L.

REGISTRO NACIONAL

PL0002132023

FORMULADORES

INTEROC S.A

Km. 16.5 vía a Daule Guayaquil – Ecuador

JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO., LTD.

11-Zitanyaju, 126 Mengdu Street, Nanjing, China.

NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.

No.1165 Beihai Road, Chemical Industry Zone of Ningbo, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province- China.

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

N°03001 Lvjian Road, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737- China.

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR

INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA

Dirección de bodega: Vereda Siberia km 2,5 Vía Bogotá - Siberia complejo logístico El pino Bodega No. 5.

FECHA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

31 de enero de 2025

DIRECCIÓN:

Vereda Siberia km 2.5,
Vía Bogotá – Siberia
Complejo Logística El
Pino Bodega No. 5

TELÉFONOS:

(+57601) 307 2390

WEB:

interoc@interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER