



INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Diflubenzuron	250 g/kg
Lambda-cyhalothrina	100 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

Nombre Químico

Diflubenzuron: 1-(4 Chlorophenyl) 3-(2,6 difluorobenzoyl) urea
Lambda-cyhalothrina: (r) -cyano (3- phenoxyphenyl)methyl (1s, 3S) -rel-3-((1Z)-2-ch loro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl) -2-2-dimethyl cyclopropanecarboxylate

No. CAS

Diflubenzuron:	35367-38-5
Lambda-cyhalothrina:	91465-08-6

FORMULACIÓN

Polvo Mojable (WP)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico:	Polvo
Color:	Beige
Olor:	Inodoro.
pH:	6.8
Densidad relativa:	1.46 g/ml (20 °C)
Humedad	Max. 2%
Humectabilidad	Max. 120 s

MODO DE APLICACIÓN

Debe ser aplicado uniformemente sobre la parte aérea del cultivo.

MODO DE ACCIÓN

Insecticida no sistémico con acción de contacto y por ingestión.

MECANISMO DE ACCIÓN

TOTTEM interrumpe el normal funcionamiento del sistema nervioso del insecto, causando parálisis o muerte, además posee propiedades repelentes e inhibe la síntesis de la quitina interfiriendo con la formación de la cutícula de los insectos.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C.	P.R.
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Cogollero tuta (<i>Scrobipalpula absoluta</i>)	75 g/200 L de agua*	15 días	4 horas
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	150 g/ha		
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	125 g/200 l de agua*		
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gusano blanco (<i>Premnotypes vorax</i>)	250 g/200 l de agua		
	Polilla guatemalteca (<i>Tecia solanivora</i>)	150 g / caneca de 200 l**		

*400 l de agua/ha

**200 l de agua/ha

P.C.: Período de carencia

P.R.: Período de reentrada

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

TOTTEM se aplica cada 15 días cuando en el cultivo se detecte la presencia de más de dos larvas por planta, para papa aplicar a la germinación, aporque y floración. Aplicar las dosis recomendadas cuando el ingeniero agrónomo lo recomienda, dependiendo de la intensidad de la infestación. Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de TOTTEM y mezcle. Adicione el resto del agua.

EQUIPOS Y VOLUMENES DE MEZCLA:

Utilizar fumigadoras de espalda, con boquillas de cono hueco tipo APT LILA. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Calibre el equipo de aspersión bajo las condiciones reales del cultivo (densidad, área foliar, objetivo de la aplicación, operario, etc.).

DIRECCIÓN:

Vereda Siberia km 2.5,
Vía Bogotá – Siberia
Complejo Logística El
Pino Bodega No. 5

TELÉFONOS:

(+57601) 307 2390

WEB:

interoc@Interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas a gran escala. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no se espera que se presenten problemas de fitotoxicidad.

PRECAUCIONES:

EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA. EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS. NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS. PROTÉJASE, CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS. PROTÉJASE, EVITE CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA.

Este insecticida debe ser aplicado a favor del viento, con equipos de aspersión bien calibrados y en buen estado. Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación". Durante las aplicaciones terrestres "utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación" además de equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno o PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para aplicación de plaguicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión. "Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón". En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo. "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado". Una vez preparado el caldo de aspersión, úselo inmediatamente, no lo guarde. Evite el uso de aguas sucias o duras debido a que puede afectar la eficacia de los equipos de aplicación y la eficacia del producto.

ADVERTENCIAS

Este producto es altamente tóxico para abejas. **"Evitar aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas. "Realizar la aplicación en horas tempranas".**

Este producto es extremadamente tóxico para peces, evitar su aplicación en zonas cercanas a fuentes de agua. Tóxico para el ganado. Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. Se deben respetar las franjas de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distante de cuerpos o cursos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación o cualquier otra área que requiera protección.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

AVISO AL AGRICULTOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4

4. LIGERAMENTE PELIGROSO. PELIGRO.

PRESENTACIONES AUTORIZADAS

Bolsas de aluminio tr laminadas, bolsas hidrosolubles, bolsas de poliéster natural, poliéster metalizado, polietileno de baja densidad natural (PEBD natural), por 50 g, 60 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1 kg y tambores con capacidad de 20 y 25 kg.

REGISTRO NACIONAL

PL0006312022

FORMULADOR

INTEROC S.A

Km. 16.5 vía a Daule Guayaquil – Ecuador

NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD

21 Jiangxia St. Ningbo 315000. China.

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

N°03001 Ivjian Road, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China.

JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO., LTD.

11 Zitanyaju, 126 Mengdu Street, Nanjing, China.

ZHUOCHEN INDUSTRIES (Shanghai) CO., LTD

Room 907, Longyu International Plaza, N° 329 Hengfeng Road, Shanghai, China.

CHINA JIANGSU INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP, LTD

Add N°5 West Beijing Road, Nanjing, Jiangsu, China.

DIRECCIÓN:

Vereda Siberia km 2.5,
Vía Bogotá – Siberia
Complejo Logística El
Pino Bodega No. 5

TELÉFONOS:

(+57601) 307 2390

WEB:

interoc@interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR

INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA

Vereda Siberia km 2,5 Vía Bogotá - Siberia complejo logístico
El pino Bodega No. 5.

FECHA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

12 de febrero de 2025

DIRECCIÓN:

Vereda Siberia km 2.5,
Vía Bogotá – Siberia
Complejo Logística El
Pino Bodega No. 5

TELÉFONOS:

(+57601) 307 2390

WEB:

interoc@Interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER